

Taxony křivatců, které nerostou na Pálavě

Křivatec český pravý (*Gagea bohemica* subsp. *bohemica*) – silně ohrožený, chráněný zákonem (C2r, §2)

Křivatec český pravý je převážně středoevropský taxon, který má v České republice dvě arely – českou a moravskou. V Čechách roste především v širším okolí Prahy, odkud byl popsán (jako *locus classicus* tohoto poddruhu jsou označovány lokality Podbaba, Libeň a Troja), zasahuje však až na jižní okraj Českého středohoří a ke Kolínu. Na Moravě se s ním nejčastěji setkáme v prostoru mezi Znojmem, Ivančicemi a Náměští nad Oslavou. Nedávno byl nalezen v Hodonínské Důbravě a u Nemojan na Vyškovsku. Jedná se o světlomilný druh nezapojených společenstev rostoucí na mělkých písčitých živinami chudých nevápnitých půdách. Křivatec český pravý kvete jako jedna z prvních středoevropských rostlin, v příhodných letech dokonce už v únoru, zároveň často roste na atraktivních místech ve skalnatých říčních údolích – tato kombinace z něj činí velmi vhodnou záminku pro první jarní výlety. Na jihozápadní Moravě se za ním můžeme vypravit třeba do údolí Oslavy, Jihlavy, Rokytné (i jejího přítoku Rouchovanky) nebo Dyje.

Křivatec český skalní (*Gagea bohemica* subsp. *saxatilis*) – kriticky ohrožený, chráněný zákonem (C1r, §2)

Křivatec český skalní je západoevropský taxon. V České republice roste pouze na střední Moravě – u Seničky, dříve i u nedaleké Náměšti na Hané. Od nominátního poddruhu se liší výraznou chlupatostí listů i lodyh. Ekologickými nároky jsou si oba poddruhy poměrně podobné. Jediná naše současná populace tohoto taxonu roste ve fragmentu zarůstající skalní lesostepi na výchozech jílovitých břidlic a jemnozrnných drob východního okraje Drahanské vrchoviny v údolí potoka Blata při jihozápadním okraji Seničky. Alarmující je, že ačkoli tato lokalita hostí jednu z nejvzácnějších rostlin České republiky, dosud není územně chráněna.